

## CosmoLab Balance Bloom Ritual

Tratamiento para Brotes Inflamados de Acné



### Indicaciones

- Tratamiento de brotes inflamatorios moderados a severos de acción rápida (reduce brotes inflamatorios al cabo de 5 a 7 días).
- Prevención y reducción de hiperpigmentaciones post-inflamatorias asociadas al acné.
- Coadyuvante en el manejo del acné hormonal en pacientes adolescentes y adultos.

### Sérum Niacinamida + Zinc

#### Ingredientes Clave:

- Zinc al 0,1%
- Niacinamida al 4%

#### Indicado para:

Pieles grasas, sensibles o mixtas con tendencia acnéica.

#### Acción:

Seborreguladora, antiinflamatoria, despigmentante suave y antioxidante.



### Mandelic Gel

#### Ingredientes Clave:

- Extracto de té verde
- Ácido Mandélico al 7%

#### Aplicación:

Localizada sobre lesiones inflamadas y manchas post acné.

#### Acción:

Antibacteriana, exfoliante suave, reduce brotes activos y marcas post acné.



### Hidrat Oil Free Cremagel

#### Ingredientes Clave:

- Alantoína
- Té verde
- Pantenol

#### Aplicación:

Ideal para todo tipo de piel, siendo especial en piel mixta, grasa, sensible y en el proceso de regeneración post peeling.

#### Acción:

Hidratación ligera en base no comedogénica, protege sin obstruir los poros. Refuerza la función barrera y mejora la tolerancia cutánea.



### MODO DE USO

#### Rutina Diurna

- 1 Limpieza:**  
Lavar el rostro de forma suave con la Espuma limpiadora LactiSkin.
- 2 Hidratación:**  
Aplicar Hidrat Oil Free con un ligero masaje.
- 3 Protección:**  
Aplicar protector solar textura gel o toque seco FPS 50+. Es importante reaplicar el bloqueador solar cada 3 horas, así no haya exposición solar directa.

#### Rutina Nocturna

- 1 Limpieza:**  
Lavar el rostro con el mismo dermolimpiador.
- 2 Tratamiento General:**  
Aplicar de 3 a 5 gotas de Serum Niacinamida + Zinc en el rostro limpio y seco, masajeando hasta la completa absorción.
- 3 Tratamiento Localizado:**  
Aplicar Mandelic Gel directamente sobre los brotes inflamados y manchas post acné, ejerciendo un suave masaje. Evitar zonas sensibles.



### PRECAUCIONES

Evitar el uso combinado con productos irritantes o ácidos exfoliantes fuertes sin supervisión profesional.

En caso de irritación persistente, suspender el uso y consultar.

No aplicar Mandelic Gel en mucosas ni piel lesionada.

### RECOMENDACIÓN DEL PROFESIONAL

- Ideal para pacientes con brotes activos y piel sensibilizada.
- Mejora visible en reducción de brotes inflamados en 1 a 2 semanas de uso constante.
- Alta compatibilidad con tratamientos dermatológicos médicos.

